

**Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование
Российской Федерации**

**2.1.10 СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ
С СОСТОЯНИЕМ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И УСЛОВИЯМИ
ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ**

**Оценка
радиационного риска у населения
за счет длительного равномерного
техногенного облучения в малых дозах**

**Методические указания
МУ 2.1.10.3014—12**

Издание официальное

**Москва
2012**

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека**

**2.1.10. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
В СВЯЗИ С СОСТОЯНИЕМ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
И УСЛОВИЯМИ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ**

**Оценка радиационного риска
у населения за счет длительного равномерного
техногенного облучения в малых дозах**

**Методические указания
МУ 2.1.10.3014—12**

ББК 51.26

О93

О93 Оценка радиационного риска у населения за счет длительного равномерного техногенного облучения в малых дозах: Методические указания.—М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2012.—26 с.

ISBN 978—5—7508—1139—7

1. Разработаны Федеральным бюджетным учреждением науки «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены им. профессора П. В. Рамзаева» (д.б.н. В. С. Репин, д.м.н. И. А. Зыкова, д.м.н. М. С. Николаевич, к.м.н. Т. М. Королева, Л. В. Репин, А. М. Библин); Федеральным государственным бюджетным учреждением «Медицинский радиологический научный центр» Министерства здравоохранения и социального развития (д.т.н. В. К. Иванов, д.м.н. А. Ф. Цыб, д.т.н. О. К. Власов, к.т.н. А. И. Горский, к.т.н. М. А. Максютков, к.б.н. В. В. Кашеев, А. Н. Меньяйло, С. Ю. Чекин).

2. Рекомендованы к утверждению Комиссией по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (протокол от 22 декабря 2011 г. № 2).

3. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г. Г. Онищенко 18 апреля 2012 г.

4. Введены в действие с момента утверждения.

5. Введены впервые.

ББК 51.26

© Роспотребнадзор, 2012

© Федеральный центр гигиены
и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2012

Содержание

1. Область применения.....	4
2. Общие положения	5
3. Исходные данные для оценки риска.....	7
4. Оценка радиационного риска в различных возрастных группах населения	7
<i>Приложение 1.</i> Примеры выполнения расчетов.....	10
<i>Приложение 2.</i> Методика вычисления коэффициентов риска....	17
<i>Приложение 3.</i> Нормативные ссылки	24
<i>Приложение 4.</i> Термины и определения.....	26

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека,
Главный государственный санитарный врач
Российской Федерации

Г. Г. Онищенко

18 апреля 2012 г.

Дата введения: с момента утверждения

**2.1.10. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ
С СОСТОЯНИЕМ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
И УСЛОВИЯМИ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ**

**Оценка радиационного риска у населения
за счет длительного равномерного техногенного
облучения в малых дозах**

**Методические указания
МУ 2.1.10.3014—12**

1. Область применения

1.1. Настоящие методические указания (далее — МУ) устанавливают процедуру оценки популяционного избыточного пожизненного риска онкологической заболеваемости, связанной с длительным равномерным облучением тела в малых дозах от техногенных источников ионизирующих излучений (ИИИ)¹ с постоянной или изменяющейся во времени средней годовой дозой облучения населения, проживающего на территориях с повышенным вследствие аварии на Чернобыльской АЭС уровнем радиоактивного загрязнения.

1.2. Количественные показатели пожизненного популяционного избыточного радиационного риска онкологической заболеваемости на уровне отдельного населенного пункта², района или субъекта³ Российской Федерации используются в системе социально-гигиенического мониторинга (далее — СГМ) для сравнительной оценки рисков и выявления причин повышенной заболеваемости злокачественными новообразованиями (далее — ЗНО)

¹ Далее по тексту, если прямо не сказано обратное, под словом «облучение» всегда подразумевается длительное равномерное облучение всего тела в малых дозах от техногенных ИИИ.

² Для оценки популяционного избыточного пожизненного риска на уровне населенного пункта численность населения должна быть не менее 1 000 человек.

³ При оценке риска на уровне района или субъекта Российской Федерации учитываются все населенные пункты, в которых проживает население, включая и населенные пункты с численностью менее 1 000 человек.

при одновременном воздействии на население различных вредных факторов среды обитания.

1.3. Методические указания не включают оценку индивидуальных радиационных рисков и оценку радиационных рисков для следующих ситуаций облучения:

- облучение пациентов, персонала и населения при использовании ИИИ в медицине с целью диагностики и лечения;
- облучение, связанное с воздействием природных ИИИ;
- облучение персонала, состоящего на индивидуальном дозиметрическом контроле;
- облучение в больших дозах и/или с большой мощностью дозы;
- неравномерное облучение, связанное с поступлением в организм радионуклидов, неравномерно распределяющихся по телу (изотопы йода и др.).

1.4. Методические указания предназначены для организаций и специалистов, участвующих в анализе данных СГМ, характеризующих влияние радиационного воздействия на здоровье населения.

2. Общие положения

2.1. Для обеспечения единства подходов в оценке влияния неблагоприятных факторов внешней среды в системе СГМ коэффициенты радиационного риска оцениваются как вероятность возникновения ЗНО⁴, связанных с воздействием ионизирующего излучения (далее — ИИ).

2.2. Целью настоящих МУ является установление единой методики оценки риска возникновения ЗНО у населения для различных сценариев равномерного⁵ техногенного облучения в малых дозах в течение различных периодов времени.

2.3. Количественной мерой воздействия радиационного фактора на человека в данных МУ является средняя годовая эффективная доза⁶ (СГЭД) внешнего и внутреннего облучения жителей за

⁴ Вклад генетических наследственных эффектов в суммарный риск от воздействия малых доз ионизирующего излучения оценивается как незначительный. В связи с этим оценка радиационного риска по критерию «генетические последствия у потомства» в данном документе не производится.

⁵ Под равномерным облучением тела подразумевается внешнее и внутреннее облучение, при котором органы и ткани получают примерно равные поглощенные дозы, например, при проживании на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС.

⁶ Использование величины эффективной дозы при оценке рисков в общем случае недопустимо, однако в ситуации равномерного техногенного облучения отличия величин поглощенных доз в органах и тканях, существенно влияющих на

счет ^{137}Cs , содержащегося в почве и в пищевых продуктах. Доза, обусловленная природным (фоновым) облучением не учитывается.

2.4. В методических указаниях приводятся методы оценки риска и/или ожидаемого количества вызванных облучением ЗНО для следующих сценариев длительного облучения⁷:

2.4.1. Облучение населения в течение года⁸.

2.4.2. Облучение населения (фиксированная когорта), исходя из предположения дальнейшего проживания на рассматриваемой территории в течение ряда лет⁹.

2.4.3. Облучение населения, проживавшего на рассматриваемой территории в течение ряда лет в любой период с 1987 г.¹⁰

2.5. Оценка риска может осуществляться для следующих групп облучаемого населения:

- дети в возрасте 0—14 лет;
- подростки 15—17 лет;
- дети и подростки 0—17 лет;
- взрослое население от 18 лет и старше;
- все население в возрасте 0—85 лет и старше.

2.6. Применительно к ситуациям облучения, описанным в п. 2.4, рассматриваются три варианта оценки ожидаемых последствий облучения:

- оценка текущей ситуации облучения (за счет облучения в течение одного календарного года);
- прогнозная оценка (за счет облучения в течение ряда последующих лет);
- ретроспективная оценка (за счет облучения в предшествующий период).

2.6.1. *Оценка текущей ситуации.* Для лиц, проживавших на данной территории на начало календарного года, оцениваются популяционные риски и число дополнительных случаев ЗНО только за счет облучения в течение одного года.

В данном варианте анализа имеется возможность:

- оценить пожизненный риск возникновения дополнительных случаев ЗНО для лиц, относящихся к конкретной возрастной группе, за счет облучения в рассматриваемом году;
- рассчитать возможное число дополнительных случаев ЗНО для заданной возрастной группы.

величину риска, от величины эффективной дозы незначительны, что позволяет использовать ее для оценки риска в рамках данных МУ.

⁷ Под длительным облучением в данном документе имеется в виду облучение в течение года и более.

⁸ Прилож. 1, примеры I, II.

⁹ Прилож. 1, пример III.

¹⁰ Прилож. 1, пример IV.

2.6.2. Прогнозная оценка. В данном варианте может быть дана консервативная оценка риска и ожидаемого числа дополнительных случаев ЗНО. Возможные последствия оцениваются исходя из предположения, что СГЭД не меняется на протяжении всего рассматриваемого периода.

2.6.3. Ретроспективная оценка. В этом варианте анализа производится оценка ожидаемого числа случаев ЗНО, обусловленных облучением за предшествующий период с учетом изменения общей численности населения (включая рождаемость, смертность, миграцию) и величины СГЭД в разные годы рассматриваемого периода.

3. Исходные данные для оценки риска

3.1. Популяционная оценка возможных последствий облучения производится как для населения в целом, так и для отдельных групп населения.

3.2. В оценках радиационного риска для конкретной группы населения используются данные о численности данной возрастной группы на том административном уровне, для которого производится такая оценка.

3.3. Информацию о половозрастной структуре населения следует брать только из официальных данных Федеральной службы государственной статистики.

3.4. Оценка риска возникновения ЗНО у населения, проживающего на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, производится по величине СГЭД, рассчитанной в соответствии с МУ 2.6.1.579—96, МУ 2.6.1.1114—02, МУ 2.6.1.2004—05 и МУ 2.6.1.2222—07.

3.5. При отсутствии данных о средних дозах облучения населения в отдельных возрастных группах значения СГЭД принимаются одинаковыми для всего населения в пределах административно-территориальной единицы, для которой осуществляется оценка риска.

3.6. Для сценария п. 2.4.2 риски рассчитываются только для лиц, входящих в изучаемую группу на начало первого года периода облучения (фиксированная когорта).

4. Оценка радиационного риска в различных возрастных группах населения

4.1. Для сценариев облучения в пп. 2.4.1 и 2.4.2 расчет риска возникновения ЗНО для конкретной возрастной группы населения производится путем умножения средней величины СГЭД в течение периода облучения на соответствующий коэффициент риска из табл. 4.1¹¹.

¹¹ Методика вычисления коэффициентов риска изложена в прилож. 2.

$$Риск = СГЭД (Зв) \times Коэффициент риска \quad (1)$$

Если используемая величина средней годовой эффективной дозы выражена в миллизивертах (мЗв) в формуле (1), следует умножить значение дозы на 0,001:

$$Риск = СГЭД (мЗв) \times 0,001 \times Коэффициент риска \quad (2)$$

Количество дополнительных случаев заболевания ЗНО в рассматриваемой возрастной группе в течение предстоящей жизни вычисляется путем умножения значения *Риска* на *Общую численность населения* данной территории и на *Долю данной возрастной группы (отн. ед.)* в общей численности населения территории¹²:

$$Кол-во заболеваний = Численность населения \times \\ \times Доля данной возрастной группы \times Риск^{13} \quad (3)$$

$$Доля данной возрастной группы = \\ = Число людей в группе / Общая численность населения \quad (4)$$

4.2. Для сценария облучения, описанного в п. 2.4.3, оценка риска не производится. Оценивается общее количество ЗНО за счет облучения в течение всего прошедшего периода только у фактически проживавшего на данной территории в конкретные годы населения путем сложения произведений величины риска на численность населения за каждый год облучения:

$$Количество ЗНО = \sum_{i=1}^N Риск за i-й год \times \\ \times Численность населения на начало i-го года, \text{ где} \quad (5)$$

Риск за i-й год — вычисляется по формулам (1) или (2) с использованием *Коэффициента риска*, равного 0,08 и величины СГЭД за *i-й год*; *N* — длительность периода облучения (лет).

4.3. Оценка числа дополнительных случаев ЗНО на уровне района производится путем суммирования рассчитанных значений

¹² В случае отсутствия данных о возрастном составе населения данной территории рекомендуется использовать данные о возрастном составе более крупной административно-территориальной единицы, включающей данную территорию. Доля численности возрастных групп в общей численности населения для РФ в целом приведена в табл. 4.2.

¹³ Вместо произведения *Численность населения* $\times$ *Доля данной возрастной группы* можно использовать значение *Численность возрастной группы*, произведение используется в ситуации отсутствия данных о возрастной структуре населения на конкретном административно-территориальном уровне. В этом случае в качестве значения величины *Численность населения* используются данные территориального уровня, а в качестве коэффициента *Доля данной возрастной группы* — данные с более высокого уровня.

количества ЗНО для каждого населенного пункта района, отнесенного к числу пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Приблизительная оценка числа случаев ЗНО в населенных пунктах с численностью населения менее 1 000 человек производится по формулам (2) и (3). Величина риска оценивается при этом для фактических возрастных групп, проживающих в данном населенном пункте, и соответствующих значений СГЭД, а оценка количества ЗНО по формуле (3) производится при условии, что «Численность населения» — это фактическое число жителей в рассматриваемой возрастной группе.

Примеры расчета рисков приведены в прилож. 1.

Таблица 4.1¹⁴

Коэффициенты избыточного пожизненного риска онкологической заболеваемости в расчете на 1 Зв равномерного техногенного облучения в течение заданного периода

Возрастная группа на начало облучения	Период облучения, лет								
	1	2	3	5	10	20	30	40	50
Дети 0—14 лет	0,17	0,33	0,48	0,77	1,42	2,47	3,26	3,85	4,25
Подростки 15—17 лет	0,12	0,24	0,35	0,57	1,07	1,88	2,49	2,91	3,15
Дети и подростки 0—17 лет	0,16	0,31	0,46	0,73	1,35	2,34	3,10	3,65	4,02
Взрослые от 18 лет и старше	0,06	0,12	0,18	0,28	0,51	0,85	1,04	1,14	1,17
Все население	0,08	0,16	0,23	0,37	0,67	1,12	1,42	1,61	1,70

Таблица 4.2¹⁵

Доля возрастных групп в общей численности населения для Российской Федерации в целом

Возрастная группа	Доля
Дети 0—14 лет	0,15
Подростки 15—17 лет	0,04
Дети и подростки 0—17 лет	0,19
Взрослые от 18 лет и старше	0,81
Все население	1,00

¹⁴ Коэффициенты в данной таблице приведены с точностью до двух знаков после запятой и получены путем округления по стандартным математическим правилам.

¹⁵ Значения, приведенные в таблице, получены путем округления до двух знаков после запятой на основе данных о возрастном составе населения Российской Федерации за 2008 г.

Примеры выполнения расчетов

Пример I

Задача

Оценить пожизненный риск онкологической заболеваемости населения в г. «Н» Брянской области за счет воздействия внешнего и внутреннего облучения в течение 2001 г., вызванного последствиями аварии на Чернобыльской АЭС.

Вычислить количество ЗНО, которые возникнут в течение предстоящей жизни по той же причине.

Решение

Средняя индивидуальная годовая эффективная доза внешнего и внутреннего техногенного облучения у жителей г. «Н» в 2001 г. составляла 0,54 мЗв¹⁶.

Вычислим риск онкологической заболеваемости по формуле:

$$\text{Риск} = \text{СГЭД (мЗв)} \times 0,001 \times \text{Коэффициент риска}$$

Коэффициент риска для группы «Всё население» из табл. 4.1 при облучении в течение одного года равен 0,08.

Следовательно, для жителей г. «Н» значение пожизненного риска онкологической заболеваемости для всего населения от воздействия внешнего техногенного облучения в течение 2001 г. равно:

$$\text{Риск} = 0,54 \times 0,001 \times 0,08 = 0,0000432 \text{ или } 4,32 \times 10^{-5}$$

Количество ЗНО, которые могут возникнуть в течение предстоящей жизни по причине воздействия на жителей г. «Н» внешнего и внутреннего облучения в течение 2001 г., вычисляется по формуле:

$$\text{Количество ЗНО} = \text{Численность населения} \times \text{Риск}$$

¹⁶ Фактические данные о дозах облучения жителей в 2001 г. в конкретных населенных пунктах, загрязненных в результате аварии на ЧАЭС, могут быть получены из справочника «Средние годовые эффективные дозы облучения в 2001 г. жителей населенных пунктов РФ, отнесенных к зонам радиоактивного загрязнения по постановлению Правительства РФ № 1582 от 18 декабря 1997 г. «Об утверждении Перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» под редакцией к.т.н. Г. Я. Брука.

Численность населения г. «Н», по данным Всероссийской переписи населения 2002 г., составляла 43 038 человек, следовательно, число случаев ЗНО, которые могут быть вызваны в течение предстоящей жизни у жителей, проживавших на начало 2001 г. в г. «Н», воздействием внешнего и внутреннего облучения в течение 2001 г., равно:

$$\text{Количество ЗНО} = 43\,038 \times 0,0000432 \approx 2 \text{ случая ЗНО}$$

Ответ

В г. «Н» Брянской области для 43 038 человек населения радиационный риск за счет дозы внешнего и внутреннего техногенного облучения в 2001 г. составляет $4,32 \times 10^{-5}$, что соответствует возникновению примерно 2 дополнительных случаев заболевания ЗНО в течение последующей жизни населения.

Пример II

Задача

Оценить пожизненный риск онкологической заболеваемости для детей, проживавших в 2001 г. в г. «Н» Брянской области, за счёт воздействия внешнего техногенного облучения в течение 2001 г., вызванного последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. Какое количество ЗНО может быть вызвано этим облучением?

Решение

Средняя индивидуальная годовая эффективная доза внешнего и внутреннего техногенного облучения у жителей г. «Н» в 2001 г. составляла 0,44 мЗв. Данные о дозе в группе «Дети 0—14 лет» отсутствуют, поэтому расчет производится для средней дозы на все население.

Вычислим риск онкологической заболеваемости по формуле:

$$\text{Риск} = \text{СГЭД (мЗв)} \times 0,001 \times \text{Коэффициент риска}$$

Коэффициент риска для группы «Дети 0—14 лет» из табл 4.1 при облучении в течение одного года равен 0,17.

Следовательно, для детей, проживавших в течение 2001 г. в г. «Н», значение пожизненного риска онкологической заболеваемости от воздействия внешнего и внутреннего техногенного облучения в течение 2001 г. равно:

$$\text{Риск} = 0,44 \times 0,001 \times 0,17 = 0,0000748 \text{ или } 7,48 \times 10^{-5}$$

Абсолютное число случаев ЗНО, которые могут возникнуть в течение предстоящей жизни за счет воздействия на детское население г. «Н» внешнего и внутреннего техногенного облучения в течение 2001 г., вычисляется по формуле:

$$\text{Количество ЗНО} = \text{Численность населения} \times \\ \times \text{Доля данной возрастной группы} \times \text{Риск}$$

В связи с отсутствием данных об абсолютном числе детей в г. «Н» на начало 2001 г., при расчете количества заболеваний используется коэффициент из табл. 4.2, значение которого для возрастной группы «Дети 0—14 лет» равно 0,15.

$$\text{Количество заболеваний} = 43\,038 \times 0,15 \times 0,0000748 \approx 0,48 \text{ случаев}$$

Ответ

В г. «Н» Брянской области для группы «Дети 0—14 лет» радиационный риск за счет дозы внешнего и внутреннего техногенного облучения в 2001 г. составляет $7,48 \times 10^{-5}$, что соответствует возникновению не более 1 дополнительного случая заболевания ЗНО в течение всей их последующей жизни.

Пример III

Задача

Оценить избыточный пожизненный риск онкологической заболеваемости для детей 0—14 лет за счёт воздействия внешнего и внутреннего техногенного облучения, вызванного последствиями аварии на Чернобыльской АЭС из предположения, что они будут проживать в г. «Н» Брянской области на протяжении 2011—2040 гг. Оценить, какое количество ЗНО может быть вызвано этим облучением?

Консервативная прогнозная оценка последствий облучения производится для следующих условий:

1. Значение СГЭД в течение 2011—2040 гг. не изменяется и равно значению СГЭД за 2011 г. — 0,6 мЗв/год.
2. Все люди, входящие в данную когорту на 2011 г., остаются проживать в данном населенном пункте.
3. Выбытие людей из данной когорты осуществляется только по причине смерти.

Решение

Средняя индивидуальная годовая эффективная доза жителей г. «Н» в 2011 г. составляла 0,6 мЗв¹⁷.

Вычислим риск онкологической заболеваемости по формуле:

$$\text{Риск} = \text{СГЭД (мЗв)} \times 0,001 \times \text{Коэффициент риска}$$

Коэффициент риска для группы «Дети 0—14 лет» из табл. 4.1 при облучении в течение 30 лет равен 3,26. Следовательно, значение пожизненного риска онкологической заболеваемости от воздействия внешнего и внутреннего техногенного облучения, при условии их проживания в этом населенном пункте в течение следующих 30 лет, равно:

$$\text{Риск} = 0,6 \times 0,001 \times 3,26 = 0,001956 \text{ или } 1,96 \times 10^{-3}$$

Консервативная оценка абсолютного числа случаев ЗНО, которые могут возникнуть в течение предстоящей жизни за счет воздействия на лиц, входящих в рассматриваемую когорту, внешнего и внутреннего техногенного облучения в течение 2011—2040 гг., вычисляется по формуле:

$$\begin{aligned} \text{Количество ЗНО} = & \text{Численность населения} \times \\ & \times \text{Доля данной возрастной группы} \times \text{Риск} \end{aligned}$$

В связи с отсутствием данных об абсолютном числе детей в г. «Н» на начало 2011 г., при расчете количества заболеваний используется коэффициент из табл. 4.2, значение которого для возрастной группы «Дети 0—14 лет» равно 0,15.

$$\text{Количество заболеваний} = 43\,038 \times 0,15 \times 0,00196 \approx 12,6 \text{ случаев.}$$

Ответ

В г. «Н» Брянской области для лиц, входящих в группу «Дети 0—14 лет» на начало 2011 г., радиационный риск за счет внешнего и внутреннего техногенного облучения в 2011—2040 гг. составляет $1,96 \times 10^{-3}$, что соответствует при консервативной оценке последствий облучения возникновению примерно 13 дополнительных случаев заболевания ЗНО в течение всей их последующей жизни.

¹⁷ Фактические данные о дозах облучения жителей в 2001 г. в конкретных населенных пунктах, загрязненных в результате аварии на ЧАЭС, могут быть получены из справочника «Средние годовые эффективные дозы облучения в 2001 г. жителей населенных пунктов РФ, отнесенных к зонам радиоактивного загрязнения по постановлению Правительства РФ № 1582 от 18 декабря 1997 г. «Об утверждении Перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», под редакцией к.т.н. Г. Я. Брука.

Пример IV

Задача

Дать ретроспективную оценку количества онкологических заболеваний, которые могли возникнуть по причине воздействия на жителей г. «Н» внешнего и внутреннего техногенного облучения в течение 1989—2009 гг., вызванного радиоактивным загрязнением территории вследствие аварии на ЧАЭС.

Дозы внутреннего и внешнего техногенного облучения, а также численность населения г. «Н» за 1989—2009 гг. приведены в таблице:

Годы	Средняя доза внутреннего облучения ^{137}Cs , мЗв	Средняя доза внешнего облучения, мЗв	Численность населения
1989	0,27	1,21	44 697
1990	0,17	0,98	44 200
1991	0,11	0,84	43 500
1992	0,08	0,74	42 400
1993	0,06	0,66	42 600
1994	0,07	0,60	42 800
1995	0,08	0,56	43 000
1996	0,12	0,56	43 300
1997	0,12	0,53	43 300
1998	0,11	0,51	43 300
1999	0,11	0,48	43 450
2000	0,11	0,46	43 600
2001	0,10	0,44	43 700
2002	0,41	0,42	43 038
2003	0,40	0,41	43 000
2004	0,39	0,39	42 850
2005	0,38	0,38	42 700
2006	0,37	0,36	42 500
2007	0,37	0,35	42 300
2008	0,36	0,34	42 200
2009	0,35	0,33	41 932

Решение

Количество ЗНО вычисляется по формуле:

$$\text{Количество ЗНО} = \sum_{i=1}^N \text{Риск за } i\text{-й год} \times \\ \times \text{Численность населения на начало } i\text{-го года}$$

Пожизненный риск Риск_i за счет облучения в i -м году вычисляется по формуле:

$$\text{Риск}_i = \text{СГЭД}_i (\text{мЗв}) \times 0,001 \times \text{Коэффициент риска}$$

$$\text{СГЭД}_i = \text{СГЭД}_i \text{ внутр.} + \text{СГЭД}_i \text{ внеш.}$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} \text{Риск}_{1989} &= (0,27 + 1,21) \times 0,001 \times 0,08 = 0,0001184 \\ \text{Риск}_{1990} &= (0,17 + 0,98) \times 0,001 \times 0,08 = 0,000092 \\ \text{Риск}_{1991} &= (0,11 + 0,84) \times 0,001 \times 0,08 = 0,000076 \\ \text{Риск}_{1992} &= (0,08 + 0,74) \times 0,001 \times 0,08 = 0,0000656 \\ \text{Риск}_{1993} &= (0,06 + 0,66) \times 0,001 \times 0,08 = 0,0000576 \\ \text{Риск}_{1994} &= (0,07 + 0,60) \times 0,001 \times 0,08 = 0,0000536 \\ \text{Риск}_{1995} &= (0,08 + 0,56) \times 0,001 \times 0,08 = 0,0000512 \\ \text{Риск}_{1996} &= (0,12 + 0,56) \times 0,001 \times 0,08 = 0,0000544 \\ \text{Риск}_{1997} &= (0,12 + 0,53) \times 0,001 \times 0,08 = 0,000052 \\ \text{Риск}_{1998} &= (0,11 + 0,51) \times 0,001 \times 0,08 = 0,0000496 \\ \text{Риск}_{1999} &= (0,11 + 0,48) \times 0,001 \times 0,08 = 0,0000472 \\ \text{Риск}_{2000} &= (0,11 + 0,46) \times 0,001 \times 0,08 = 0,0000456 \\ \text{Риск}_{2001} &= (0,10 + 0,44) \times 0,001 \times 0,08 = 0,0000432 \\ \text{Риск}_{2002} &= (0,41 + 0,42) \times 0,001 \times 0,08 = 0,0000664 \\ \text{Риск}_{2003} &= (0,40 + 0,41) \times 0,001 \times 0,08 = 0,0000648 \\ \text{Риск}_{2004} &= (0,39 + 0,39) \times 0,001 \times 0,08 = 0,0000624 \\ \text{Риск}_{2005} &= (0,38 + 0,38) \times 0,001 \times 0,08 = 0,0000608 \\ \text{Риск}_{2006} &= (0,37 + 0,36) \times 0,001 \times 0,08 = 0,0000584 \\ \text{Риск}_{2007} &= (0,37 + 0,35) \times 0,001 \times 0,08 = 0,0000576 \\ \text{Риск}_{2008} &= (0,36 + 0,34) \times 0,001 \times 0,08 = 0,000056 \\ \text{Риск}_{2009} &= (0,35 + 0,33) \times 0,001 \times 0,08 = 0,0000544 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Количество ЗНО} &= 0,0001184 \times 44\,697 + 0,000092 \times 44\,200 + \\ &+ 0,000076 \times 43\,500 + 0,0000656 \times 42\,400 + 0,0000576 \times 42\,600 + \\ &+ 0,0000536 \times 42\,800 + 0,0000512 \times 43\,000 + 0,0000544 \times 43\,300 + \\ &+ 0,000052 \times 43\,300 + 0,0000496 \times 43\,300 + 0,0000472 \times 43\,450 + \end{aligned}$$

МУ 2.1.10.3014—12

$$\begin{aligned} &+ 0,0000456 \times 43\,600 + 0,0000432 \times 43\,700 + 0,0000664 \times 43\,038 + \\ &+ 0,0000648 \times 43\,000 + 0,0000624 \times 42\,850 + 0,0000608 \times 42\,700 + \\ &+ 0,0000584 \times 42\,500 + 0,0000576 \times 42\,300 + 0,000056 \times 42\,200 + \\ &+ 0,0000544 \times 41\,932 \approx 55,55 \end{aligned}$$

Ответ

У населения г. «Н» по причине воздействия внешнего и внутреннего техногенного облучения на всех жителей, проживавших в течение 1989—2009 гг., могут возникнуть приблизительно 56 дополнительных случаев заболевания ЗНО в течение предстоящей жизни.

Методика вычисления коэффициентов риска

Для расчета табл. 4.1 использовалась следующая методика.

Коэффициенты радиационного риска возникновения солидных ЗНО у населения Российской Федерации рассчитаны на основе моделей, представленных в материалах Научного Комитета ООН по Действию Атомной Радиации за 2006¹⁸ г. Коэффициенты риска возникновения лейкозов рассчитаны на основе моделей, представленных в материалах Научного Комитета ООН по Действию Атомной Радиации за 2000 г.¹⁹

В расчетах коэффициентов радиационного риска использованы данные об уровнях онкологической заболеваемости, общей смертности и половозрастном составе населения Российской Федерации за 2008 г.

Коэффициенты риска включают в себя оценки для ЗНО следующих органов и тканей:

- пищевода;
- желудка;
- ободочной кишки;
- печени;
- легких;
- молочной железы у женщин;
- мочевого пузыря;
- щитовидной железы;
- мозга и центральной нервной системы;
- костей;
- кожи (за исключением меланомы);
- солидные ЗНО других органов и тканей;
- лимфоидной и кроветворной тканей (только лейкозы).

Вычисление коэффициентов риска, приведенных в табл. 4.1, происходит в несколько этапов.

На *первом этапе* по методикам, описанным в докладе НКДАР ООН, 2006 г., вычисляется избыточный абсолютный риск (Excess Absolute Risk, или *EAR*) заболеваемости для отдельных видов солидных раков и для лейкозов²⁰ у лиц определенного пола (*s*), облученных в дозе *D* в возрасте *e* и доживших до возраста *a*.

¹⁸ United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) 2006 Report to the General Assembly, with Scientific Annexes, New York, 2008.

¹⁹ United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) 2000 Report to the General Assembly, with Scientific Annexes, New York, 2000.

²⁰ Оценки для лейкозов сделаны на основании моделей из отчета НКДАР ООН 2000 г.

Вычисление производится по аддитивной (формула П1) и мультипликативной (формула П2) моделям:

$$EAR_{c,add}^s(e,a,D) = (\alpha_{c,add} \cdot D_e + \beta_{c,add} \cdot D_e^2) \cdot \exp [k_{c,add,1} \cdot 1_{s=female} + k_{c,add,2} \cdot \ln(e) + k_{c,add,3} \cdot \ln(a-e) + k_{c,add,4} \cdot \ln(a)] \quad (\text{П1})$$

$$EAR_{c,mult}^s(e,a,D_e) = h_{c,0}^s(a) \cdot (\alpha_{c,mult} \cdot D_e + \beta_{c,mult} \cdot D_e^2) \cdot \exp [k_{c,mult,1} \times 1_{s=female} + k_{c,mult,2} \cdot \ln(e) + k_{c,mult,3} \cdot \ln(a-e) + k_{c,mult,4} \cdot \ln(a)], \text{ где:} \quad (\text{П2})$$

$h_{c,0}^s(a)$ — фоновый (т. е. при отсутствии облучения) риск возникновения солидных ЗНО²¹ отдельных локализаций (с) у лиц определенного пола (s) и возраста (a);

$1_{s=female}$ — функция, принимающая значение «1» для лиц женского пола и «0» для лиц мужского пола;

$\alpha, \beta, \gamma, k_1, k_2, k_3, k_4$ — коэффициенты модели. Значения коэффициентов для отдельных локализаций солидных раков (с) в аддитивной (add.) и мультипликативной (mult.) моделях приведены в табл. П1.

При пролонгированном облучении в течение нескольких лет, начиная с возраста e , EAR в достигнутом возрасте t ($t > e$) вычисляется как сумма EAR от облучения в разные годы:

$$EAR_c^s(e,t,\{D\}) = \begin{cases} \sum_{a=e}^{\min(t-L_c, a_{\max})} EAR_c^s(a,t,D_a), & \text{если } t \geq e + L_c \\ 0, & \text{если } t < e + L_c \end{cases}, \text{ где} \quad (\text{П3})$$

EAR — избыточный абсолютный риск (по аддитивной или мультипликативной моделям);

s — пол облученного лица;

c — локализация ЗНО. Оценки производятся для 13 различных локализаций солидных ЗНО;

e — возраст начала облучения;

L_c — минимальный латентный период для радиогенных ЗНО локализации с. В данных методических указаниях в соответствии с рекомендациями 103 Публикации МКРЗ $L_c = 10$ лет для всех локализаций солидных ЗНО²²;

t — достигнутый возраст;

a — возраст при облучении;

²¹ Оценки для случаев заболевания лейкозами сделаны на основании моделей из отчета НКДАР ООН 2000 г.

²² При вычислении коэффициентов риска для лейкозов в соответствии с рекомендацией 103 Публикации МКРЗ использовано значение $L_c = 2$ года.

D_a — годовая доза облучения в возрасте a ;
 $a_{\max} \leq t$ — возраст окончания облучения;
 $\{D\}$ — массив доз облучения D_a от возраста e до возраста $a_{\max}$
 $(e \leq a \leq a_{\max})$.

На *втором этапе* вычисляется функция здорового (по локализации s) дожития от возраста e до возраста t :

$$S_c^s(e, t, \{D\}) = \exp \left(- \sum_{a=e}^{t-1} [\mu^s(a) - \mu_c^s(a) + h_c^s(a) + \right. \quad (\text{П4}) \\ \left. + EAR_c^s(e, a, \{D\})] \right), \text{ где:}$$

$\mu^s(a)$ — фоновый (т. е. при отсутствии облучения) риск смерти от всех причин для лиц пола s в возрасте a ;

$\mu_c^s(a)$ — фоновый риск смерти от ЗНО, локализации s , для лиц пола s в возрасте a ;

$h_c^s(a)$ — фоновый риск выявления²³ ЗНО локализации s , для лиц пола s в возрасте a .

На *третьем этапе* для лиц обоих полов и каждого возраста на начало облучения вычисляются коэффициенты избыточного пожизненного радиационного риска онкологической заболеваемости *REIC* (Risk of Exposure-Induced Cancer incidence).

Данные коэффициенты учитывают вероятность здорового дожития лица определенного пола от возраста при облучении (e) до достигнутого возраста (t), обусловленную рисками как радиационной, так и нерадиационной природы. При делении избыточного пожизненного риска на величину дозы получается коэффициент избыточного пожизненного риска на единицу дозы²⁴.

$$REIC_c^s(e, D_e) = \frac{\int_{e+L_c}^{T_{\max}} EAR_c^s(e, t, D_e) \cdot S_c^s(e, t, D_e) dt}{D_e}, \text{ где:} \quad (\text{П5})$$

$S_c^s(e, t, D_e)$ — функция здорового (по ЗНО локализации s) дожития до возраста t при облучении лица пола s в дозе D_e в возрасте e ;

²³ Использованы повозрастные показатели первичной постановки диагноза (инцидентность).

²⁴ При вычислении коэффициентов риска на единицу дозы величина избыточного абсолютного риска для данных методических указаний рассчитывалась для дозы 0,001 Зв.

$T_{\max}$ — максимальный возраст оценки риска (в данных МУ $T_{\max} = 90$ лет).

В случае пролонгированного облучения, приближенно заменяя интеграл в формуле П5 суммированием по целочисленным годам, с учетом П3 и П4, получаем коэффициент избыточного пожизненного радиационного риска онкологической заболеваемости $REIC$, нормированный на единицу дозы среднегодового облучения за период облучения T лет, для лиц возраста e на начало облучения:

$$REIC_c^s(e, T) = \frac{\sum_{t=e+1}^{T_{\max}} S_c^s(e, t, \{D\}) \cdot EAR_c^s(e, t, \{D\})}{\frac{1}{T} \sum_{a=e}^{a_{\max}} D_a}, \text{ где:} \quad (\text{П6})$$

$T_{\max}$ — максимальный возраст дожития;

e — возраст начала облучения;

$a_{\max}$ — возраст окончания облучения;

$T = a_{\max} - e + 1$ — длительность периода облучения;

$\frac{1}{T} \sum_{a=e}^{a_{\max}} D_a$ — средняя годовая доза облучения индивидуума за пе-

риод T лет от возраста e до возраста $a_{\max}$.

После этого производится усреднение коэффициентов, рассчитанных по аддитивной и мультипликативной моделям в соответствии с рекомендациями 103 Публикации МКРЗ: «весовые множители $ERR : EAR^{25}$ равны 0 : 1 для молочной железы и костного мозга и 1 : 0 для щитовидной железы и кожи, 0,3 : 0,7 для легкого и 0,5 : 0,5 для всех остальных локализаций».

Далее рассчитывается суммарный коэффициент избыточного пожизненного радиационного риска онкологической заболеваемости REC по всем локализациям ЗНО:

$$REC^s(e, T) = \sum_{c=1}^{13} REIS_c^s(e, T) \quad (\text{П7})$$

На четвертом этапе вычисляются коэффициенты избыточного риска возникновения ЗНО для возрастных групп, включающих на начало облучения лиц обоих полов в возрасте от e_1 до e_2 включительно. Распределение в данной группе лиц по полу и возрасту со-

²⁵ Аббревиатурам ERR и EAR соответствуют названия «модель относительного риска» (мультипликативная модель) и «модель абсолютного риска» (аддитивная модель) соответственно.

ответствует распределению в Российской популяции, по данным Росстата за 2008 г. Коэффициенты рассчитываются для случая облучения данной возрастной группы в течение T лет.

$$R_{pop}^s([e_1, e_2], T) = \frac{\sum_s \sum_{e=e_1}^{e_2} REIC^s(e, T) \cdot n_e^s}{\sum_s \sum_{e=e_1}^{e_2} n_e^s}, \text{ где:} \quad (\text{П8})$$

n_e^s — число лиц пола s , в возрасте e , по данным Росстата о половозрастном составе Российской популяции за 2008 г.;

T — длительность периода облучения;

$\sum_s \sum_{e=e_1}^{e_2} n_e^s$ — общее число мужчин и женщин в возрастах от e_1 до

e_2 , по данным Росстата о половозрастном составе Российской популяции за 2008 г.

В табл. 4.1 приведены коэффициенты избыточного пожизненного риска онкологической заболеваемости в расчете на 1 Зв равномерного техногенного облучения в течение заданного периода T (данные в столбцах) для различных возрастных групп на начало облучения (данные в строках).

Расчеты выполнены для следующих пар значений e_1, e_2 ²⁶.

Возрастная группа	e_1	e_2
Дети 0—14 лет	0	14
Подростки 15—17 лет	15	17
Дети и подростки	0	17
Взрослые	18	100 и старше
Все население	0	100 и старше

При вычислении коэффициентов риска в данных МУ использованы данные о структуре населения, заболеваемости и смертности в Российской Федерации за 2008 г.

Коэффициенты на единицу дозы рассчитаны с использованием величин доз $D = 0,001$ Зв.

²⁶ Данные Росстата не содержат повозрастных сведений о лицах старше 99 лет. Поэтому в расчетах все лица в возрасте 100 лет и старше считаются лицами в возрасте 100 лет.

Таблица П1

**Коэффициенты модели оценки риска возникновения
злокачественных новообразований НКДАР ООН 2006 г.**

	Пищевод	Желудок	Толстая кишка	Печень	Легкое	Молочная железа	Мочевой пузырь	Щитовидная железа	Кость	Другие новообразования кожи	Мозг и ЦНС	Другие солидные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Модель EAR												
α	1,45293E-05	3,96925E-07	2,87527E-09	1,03736E-10	1,0083E-11	1,94038E-05	6,13572E-15	0,00026287	0	0	4,92382E-05	2,20751E-07
β	0	0	0	0	0	0	0	0	9,3294E-06	5,24549E-09	0	0
γ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,2739	0	0
k_1	0	0	0	0	0,4008	0	0	1,3624	0	0	0	0
k_2	0	1,828	0	3,479	4,211	0	5,748	0	0	0	0	0

Продолжение табл. П1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
k_3	0	0	3,204	0	0	1,086	0	0	0	2,885	0	2,161
k_4	0	0	0	0	0	0	0	— 0,3883	0	0	0	0
Модель ERR												
α	0,52782	4 025,03	1 480 800	0,395106	0,318224	14 922,1	0,898885	38 045,2	0	0	7,43145	143,22
β	0	0	0	0	0	0	0	0	69 037 900	2 615,26	0	0
γ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	— 0,272	0	0
k_1	0	0	0	0	1,4808	0	0	0	0	0	0	0
k_2	0	— 2,253	— 3,526	0	0	— 2,304	0	— 2,197	— 4,472	— 4,595	0	— 2,939
k_3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,196	0	1,645
k_4	0	0	0	0	0	0	0	— 0,4405	0	0	— 0,9897	0

Нормативные ссылки

1. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
2. Федеральный Закон от 9.01.96 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».
3. СанПиН 2.6.1.2523—09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».
4. СП 2.6.1.2612—10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 718 «О порядке создания единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. № 60 «Об утверждении Положения о социально-гигиеническом мониторинге».
7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2000 г. № 298 «Об утверждении Положения о единой государственной системе контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан».
8. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 30 декабря 2005 г. № 810 «О Перечне показателей и данных для формирования Федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга».
9. МУ 2.6.1.579—96 «Реконструкция средней накопленной в 1986—1995 гг. эффективной дозы облучения жителей населенных пунктов Российской Федерации, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году».
10. МУ 2.6.1.784—99 «Зонирование населенных пунктов Российской Федерации, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, по критерию годовой дозы облучения населения».
11. МУ 2.6.1.1114—02 «Реконструкция средней накопленной в 1986—2001 гг. эффективной дозы облучения жителей населенных пунктов Российской Федерации, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Дополнение 1 к МУ 2.6.1.579—96)».

12. МУ 2.6.1.1868—04 «Внедрение показателей радиационной безопасности о состоянии объектов окружающей среды, в т. ч. продовольственного сырья и пищевых продуктов, в систему социально-гигиенического мониторинга».

13. МУ 2.6.1.2004—05 «Реконструкция средней (индивидуализированной) накопленной эффективной дозы облучения жителей населенных пунктов Российской Федерации, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Дополнение 2 к МУ 2.6.1.579—96».

14. МУ 2.6.1.2003—05 «Оценка средних годовых эффективных доз облучения критических групп жителей населенных пунктов Российской Федерации, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС».

15. МУ 2.6.1.2222—07 «Прогноз доз облучения населения радионуклидами цезия и стронция при их попадании в окружающую среду».

16. МР «Радиационный мониторинг доз облучения населения территории, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС».

17. МУ 2.6.1.2319—08 «Зонирование населенных пунктов Российской Федерации, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, по критерию годовой дозы облучения населения. Дополнение 2 к МУ 2.6.1.784—99».

18. МР 2.6.1.0007—10 «Оценка доз облучения детей, проживающих на территориях, радиоактивно загрязненных вследствие аварии на Чернобыльской АЭС».

19. МР 2.6.1.0006—10 «Проведение комплексного экспедиционного радиационно-гигиенического обследования населенного пункта для оценки доз облучения населения».

20. МР «Социально-гигиенический мониторинг. Анализ медико-демографических и социально-экономических показателей на региональном уровне».

21. Информационно-методическое письмо Департамента госсанэпиднадзора МЗ РФ №1100/731—01-111 от 26 марта 2001 г. «Оценка риска многосредового воздействия химических веществ (расчет дозовой нагрузки, критерии оценки риска канцерогенных и неканцерогенных эффектов)».

Термины и определения

Доза эффективная — величина, используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов и тканей с учетом их радиочувствительности. Она представляет сумму произведений эквивалентной дозы в органах и тканях на соответствующие взвешивающие коэффициенты.

Риск — вероятность наступления нежелательных последствий.

Радикационный риск индивидуальный — вероятность возникновения у человека или у его потомства какого-либо вредного эффекта в результате облучения.

Риск популяционный — сумма индивидуальных рисков для всех лиц, входящих в исследуемую популяцию.

Риск пожизненный — вероятность возникновения негативных последствий для здоровья по причине воздействия негативного фактора среды обитания в течение всей предстоящей жизни.

Риск избыточный — разница между оценкой риска, рассчитанной при условии воздействия конкретного негативного фактора среды обитания, и оценкой риска, рассчитанной при условии отсутствия воздействия названного фактора.

Фиксированная когорта — выборка, в которую не набирают новых членов, так как она фиксирована моментом определенного события («нулевым моментом времени»); например, когорта выживших после взрыва атомной бомбы в Хиросиме.

Социально-гигиенический мониторинг (СГМ) — государственная система наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обитания, их анализа, оценки и прогноза, а также определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды обитания.

Малые дозы ионизирующего излучения — дозы, не превышающие 0,1 Гр.

**Оценка радиационного риска у населения за счет длительного
равномерного техногенного облучения в малых дозах**

**Методические указания
МУ 2.1.10.3014—12**

Редактор Л. С. Кучурова
Технический редактор А. А. Григорьев

Подписано в печать 22.11.12

Формат 60×88/16

Тираж 200 экз.

Печ. л. 1,75
Заказ 70

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
127994, Москва, Вадковский пер., д. 18, стр. 5, 7

Оригинал-макет подготовлен к печати и тиражирован
отделом издательского обеспечения
Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора
117105, Москва, Варшавское ш., 19а

Отделение реализации, тел./факс 952-50-89